ニ御說明アリ或時ハヒマラヤ山ノロードデンドロンヲ、又或時ハ南歐ノエリカヲ自由自在ニ聽者ノ眼前ニ現出セシメル先生ノ舌藝ハ誠ニ敬服ノ外ナシ先生ノ御講演ハ約一時間ニシテ終リ川村博士ハ「只今牧野先生ノ御話ヲ承ハッテ獨逸ニ於ケルエリカノ花時ノ事ヲ思イ出シマシタカラ少シ語ラセテイタヾキタイ」トテ我國ノさくら季節ノ如ク賑フ彼地ノエリカ季節ノ興味深キお話アリ會員一同大喜ビナリ

尾根ヨリ下リなら林ニ入ルこならノ枯枝ニきらくげ樣ノモノ多數着ケリ是レ牧野先生ヨリ川村博士ニ送ラレ今日度々話題ニ上リ居ル一菌ナリ余其樹ニ攀ヂ登リ幹ヲ垂レ曲ゲテ博士ノ御選收ヲ乞フ數多キ中ニ稍々老イタルモノヲ御發見ナサレ博士ハ是ニテ此菌ノ本性ガ明カニナレリトテ滿足ナサレヌ此菌ハ無毒ニテ食用トナルベキモノニテトレメラ科ニ屬シ Exidia glandulosa Fr. ト稱スルナリトゾ、林中ニめぎんりやうさう生ズ瓣片三枚ナレバ五枚アルぎんりやうさうト容易ニ識別スルコトガ出來ル、道ハ復タ登リ分水境ヲ越エテ西流ノ小溪畔ニ降ルやまるりさう花咲キかんあふひ枯葉ノ下ニ有斑ノ綠葉ヲ擡ゲタリ、是ヨリ一行ハ歸路ニ就キ佛子新道ノ要害橋々畔ニ出デ入間川ニ沿フテ佛子驛ニ向フ日沒スルニ及ビ本日ノ採集會ハ終リヲ告ゲヌ

●斷枝片葉（其四十一）

牧野富太郎

●野生トナッタ胡蘿蔔のらにんじん　關西地方へ行クト往々にんじん卽チ胡蘿蔔(Daucus Carota L.)ノ野生ニナッタ者ヲ見受ケル卽チ山城以西播州邊マデノ間ノ地デ之レニ出逢フ事ハ敢テ珍ラシイコトデハナイ之レヲのらにんじん(新稱)ト稱スル、通常川ノ土堤ヤ或ハ山足ノ邊若クハ岡ノ上ナドニ生ジ全體家植にんじんノ瘠セタ形狀ヲ呈シ高サハ花時往々三尺內外ニ及ブモノガアル苗ハ瘠小デ恰モ雜草ノ態ヲ成シ又葉モ瘠セ繖花モ小形デアル根ハ直根デ瘠セテ白イガ肥地ノ者ハ多少肉質デ微ニ柑黃色ヲ呈シテ居ル、其苗ノ初期ノ時ハ酷ダ能クや

ぶじらみ(Torilis Anthriscus Gmel.)ノ苗ト似テ居リ此兩者ハ其緣ノ近イモノデアル事ガ首肯セラルヽ、此野生ノ者ハ亦支那ニモアルト見エテ同國デハ之レヲ野胡蘿蔔ト云ッテ居リ其圖說ガ前ニ『救荒本草』後ニ『植物名實圖考』ニ出テ居ル、我日本ノ野生品ハ無論素カラノ野生デナク蓋シ家植ノにんじんカラ逸出シテ遂ニ野生トナリ原始ノ形態即チ雜草ノ原狀ニ復歸シタモノデアラウト思フ、此野生品ニ就テハズット以前ニ私ハ『植物學雜誌』ニ書イテ置イタ事ガアッタ、にんじんハ廣ク我邦諸州デ普通ニ栽培シテ居ルカラ其家植品ノ在ル處デハ何處デモ其逸出品ガ出來サウニ思ヘルガ其レガサウハ行カズニ凡ソ前記ノ地方方面ニ限ラレテ居ル所ヲ以テ考フルニ或ハ何カ其土質ニ關係ヲ以テ居ルノデハアルマイ歟ト思ハレテナラナイ即チ家植だいこんノ逸出品タルはまだいこんガ唯海邊ニノミ局限セラレテ生エテ居ルト同ジ樣ニ此のらにんじんモ何カ其生育地ヲ局限セヲルヽ原因ガ其間ニ在リハシナイ乎其理由ヲ探求スル事ハ學問上興味ノアル事ト思フ、前記『救荒本草』ノ野胡蘿蔔ニ就テノ記文ハ次ノ如ク即チ「野胡蘿蔔　荒野ノ中ニ生ジ苗等ハ家胡蘿蔔ニ似テ俱ニ細小ナリ葉間ニ莖叉ヲ攢生シ梢頭ニ小白花ヲ開ク衆花攢開シテ傘蓋ノ狀ノ如シ蛇床子花ニ比スレバ頭叉大ナリ、子ヲ結ブコト蛇床子ニ比スレバ亦大ナリ其根ハ家胡蘿蔔ニ比スレバ尤モ細小ニシテ味ハ甘ナリ　救飢　根ヲ採リ洗淨シ皮ヲ去リ生ニテ食フモ亦可ナリ」（漢文）デアル、又『植物名實圖考』ニハ『救荒本草』ノ文ヲ引テ記シ末ニ「按ズルニ此草處々ニ之レアリ湖南ノ俚醫ハ呼ンデ鶴蝨ト爲ス天名精ト同名ナリ亦其花白クシテ鶴ノ如ク子細クシテ蝨ノ如キニ肖タルノミ」（漢文）ト補記シテアル而シテ其圖ハ『救荒本草』ノ其レニ比スレバ最モ能ク其眞ヲ寫シ出シテ居ル、此胡蘿蔔ヲ先輩ハのにんじん即チやぶにんじんトシテ居レドモ是レハ誤リデアル故ニ私ハ之レヲのらにんじんト呼ンダ、此ノ如キ自生品ハ歐洲ノ英國ナドニモアリテ原野、路傍或ハ海濱ニ野生シテ居ルトノ事デアル尙ホ其レガ歐洲ノ其他ノ諸州、アフリカ北部、アジア北部、西部幷ニ南部ニ迄分布シテ居ルヤウダ、飜テ想フニ我邦ノ野生品ハ或ハ德川時代頃ニヒョットシタラ西洋種ガ這入リ込ンダモノカモ知レヌガ今日其證據ハ少シモナイ